

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

LP 20-6-68 793182

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION DE LA RÉGION PARISIENNE

PARIS, HAUTS DE SEINE, SEINE-SAINT-DENIS, VAL-DE-MARNE, ESSONNE, VAL-D'OISE, YVELINES, SEINE-ET-MARNE, EURE

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux, 47 Av. Paul-Doumer, (93) MONTREUIL-S-BOIS - 287 76-71

C. C. P. PARIS 9063-96

19 JUIN 1968

ABONNEMENT ANNUEL
25 F

BULLETIN N° 93
Supplément n° 1

AVERTISSEMENTS

MILDIOU DE LA POMME DE TERRE

GRANDE CULTURE

Des taches sont à nouveau apparues vers le 14 juin. Des contaminations ont pu se produire le 14 et plus sûrement le 16 juin. Une nouvelle sortie de taches est à craindre pour la fin de la semaine. Un traitement doit donc être effectué dès réception de ce bulletin pour éviter une extension de la maladie.

Ce traitement est valable en tous secteurs.

Des taches ont surtout été observées en cultures hâtives. Bien surveiller ces cultures généralement non traitées avant arrachage, ces dernières pouvant constituer des foyers à partir desquels la maladie s'étendra dans les plantations plus tardives.

- DORYPHORE : Ajouter un insecticide (voir liste des produits) à la bouillie anti-mildiou.

CARPOCAPSE DES POMMES ET DES POIRES

CULTURES FRUITIÈRES

En général les sorties d'adultes sont plus importantes. Elles sont faibles encore dans les secteurs les plus froids de la région parisienne. Les conditions climatiques ont été un peu plus favorables et des pontes plus importantes ont été déposées. Les éclosions devraient se produire à la fin de cette semaine. Un traitement est à appliquer dès réception de cet avis, dans les vergers des secteurs chauds et ceux des secteurs froids où les dégâts sont habituellement élevés. Attendre, dans les autres situations.

- TAVELURE : Les contaminations par ascospores ne sont plus à craindre que dans les vergers très touchés l'année dernière. Dans ces vergers et dans ceux où des taches existent actuellement, profiter du traitement Carpopapse pour intervenir.

INFORMATIONS

- ACARIENS : Fortes éclosions des pontes d'été en secteurs chauds.
- PSYLLES : Attaques importantes localement : adultes, pontes, larves. Peuvent être également utilisés : Diéthion 100 g., Diméthoate 30 g., Lindane 30 g., Parathion 20 à 30 g. et Vamidothion 50 g. de matière active/hectolitre.

CULTURES LÉGUMIÈRES

- TEIGNE DU POIREAU : Début d'un nouveau vol le 12. Les éclosions ne devraient pas se produire avant la fin du mois.
- MOUCHE DU CHOU : Le vol s'intensifie.

L'Ingénieur et l'Agent Technique
chargés des Avertissements Agricoles,

H. SIMON et R. MERLING.

L'Inspecteur
de la Protection des Végétaux,

G. BERGER.

Dernière Note : Bulletin 93 du 12 juin 1968.

Imprimerie de la Station de la Région Parisienne - Directeur-Gérant : L. Bouyx.
47, Avenue Paul Doumer - 93 - Montreuil-sous-Bois.

7184